

入院される患者様へ

医師が安全で的確なお薬を処方するために、入院時に服用しているお薬を知っておく必要があります。その為、入院時には現在服用中のお薬のほか、お薬手帳やお薬の情報をお持ちください。

**★他の病院で処方されているお薬のある方は、
入院期間中のお薬を処方してもらい、持参して下さい。**

こちらでは御用意できないお薬がありますので、ご協力お願い致します。

他に大衆薬やサプリメントについてもお知らせください。

入院時に持参していただくもの

☆ 現在服用中の薬



☆ 目薬や塗り薬もお持ちください。



☆ お薬手帳



☆ 薬剤情報(薬局、病院でもらったお薬の説明書)

八王子 太郎 様

調剤日 2004年6月1日

内科

☆ゼンタック錠75(2錠)

1日2回眼前、朝食後 14日分

胃・十二指腸潰瘍、胃炎のお薬です。

☆ローコール錠20mg(1錠)

1日1回起床時 14日分

高脂血症のお薬です。コレステロールの含

成をおさえます。

☆オイグルコン錠1.25mg(6錠)

1日2回眼前、朝食後 14日分

血糖を下げるお薬で、糖尿病の治療に用い

られます。

☆バファリン81mg錠(1錠)

1日1回朝食直前 14日分

血を固まりにくくし、血液の流れをよくす

るお薬です。

2. ローコール錠20mg(フルバスタチンナトリウ

ム錠) と他の医薬品等との併用に関する注意事

項

腎臓の機能に障害のある方がHMG-CoA還元酵素阻

害薬(ローコールなど)とフィbrate系薬剤の

ベザフィbrate(ベザトールSRなど)、クリノ

フィbrate(リボクリンなど)、クロフィbr

ate(ヒボセロールなど)、あるいはフェノフィ

brate(リバンチルなど)を併用すると、筋肉

がとけて成分が血液へ流れでる横紋筋融解症(初

期症状:筋肉痛、脱力感、尿が赤褐色になるな

ど)をおこすことがあります。

(注) 薬品名の後の O 内は、内服薬は1日量、

朝服・外用は全量を表示しています。

気になることがありましたら、遠慮なくご連絡

ください。お大事に。

じほう総合病院

東京都千代田区〇〇1-1

TEL 03-3265-7765